

NIEUWS VAN HET ZWIN : 18 augustus 1983.

1. In de zwinschorre is het broedseizoen afgesloten :
 - naast ongeveer 5.000 paar kokmeeuwen broedden er ook nog 1 paar zwartkop-, 2 paar storm- en 12 zilvermeeuwen ;
 - niet minder dan 320 paartjes visdiefjes, 1 paar noordse stern en ook dit jaar weer een exemplaar Dougall's stern, gepaard met een visdiefje ;
 - de beheerswerken van de vorige jaren leverden gelukkig een toename op van kluten ; we noteerden 33 paar ;
 - 60 paar scholekster, 38 tureluurs, 12 strandpleviers, 75 paar bergeenden en 1 paar kuifeend kwamen tot broeden in het Zwin zelf of/en de onmiddellijke omgeving.
2. De maanden augustus en september zijn een bijzonder interessante periode voor het observeren van roofvogels op trek. Vooral in de polders zijn torenvalk en bruine kiekendief algemeen. Op 7 augustus laatstleden zagen we met een geleid bezoek niet minder dan 8 roofvogels : 2 torenvalken, een wespendif, 2 buizerden, 1 bruine en 2 grauwe kiekendieven.
3. Enkele bijzondere waarnemingen :
 - 2 overzomerende kepen ; men kan hun zang horen bij de ingang van het reservaat ;
 - een lachstern op 11 augustus ;
 - een kleine zilverreiger die voor het eerst gezien werd op 10 juni zou hier overzomeren.
4. In augustus is de Zwinschorre een enorm paars tapijt. In deze periode bloeit de lamsoor (de zwinneblomme). Andere typische schorreplanten zoals schijnspurrie, zeekraal, klein schorrekruid, gewone en gesteelde zoutmelde bloeien eveneens. Ten gevolge van de erg droge zomer bloeien in de duinen betrekkelijk weinig planten. In de schorre echter is de nadelige invloed van de droogte heel wat geringer. Deze typische planten, men noemt ze halofyten, verdragen niet alleen rechtstreekse zeewaterinvloed doch kunnen er zelfs voedingssappen uit opvangen.

De Cons'rvator,

Guido Burggraeve.